

The background features a light blue gradient with several stylized butterflies and flowers. A large orange and red butterfly is positioned in the upper left. Below it, a purple banner contains the text. The lower half of the image shows a cluster of colorful flowers in shades of blue, yellow, red, and green.

GESAR LUPUS
Córdoba 2012

Objetivos:

- **A) Tratar los temas sobre los que hemos trabajado hasta ahora con sus respectivos avances y dificultades**
- **B) Nuevos proyectos**

A) temas sobre los que hemos trabajado hasta ahora con sus respectivos avances y dificultades

- ✓ Estudio multicéntrico de prevalencia de anticuerpos anti ribosomal p en Lupus Eritematoso Sistémico de comienzo pediátrico comparado con lupus eritematoso sistémico del adulto (CEMIC).
- ✓ Compromiso neurocognitivo en LES (H Británico).
- ✓ Estudio de prevalencia de NL en Argentina (HIGA SM).

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA NEFRITIS LÚPICA EN ARGENTINA INFORME PRELIMINAR.


Grupo de Estudio de LES de la Sociedad Argentina de Reumatología

- Graf C; Sansinanea P; García M; Dubinsky D; Salas A; Velozo E; Papasidero S; Chaparro R; Rillo O; Martinez B; Díaz M; Risueño F; Allievi A, Muñoz S; Soldano J; Caputo M; Bottinelli Y; Iriarte Padula M; Casas H; Curti A; Pisoni C; Eimon A; Esposito M; Lancioni E; Soriano E; Spindler W; Spindler A; Pena C; Costi C; Sosa A; Alvarez A; Sarano J; Collado V; Gomez G; Pendon G; Pereira D; Ruffino J; Ferreyra Mufarregue L; Vijoditz G; Lopez N; Chiganer E; Paolini M; Quintana R; Pons-Estel B; Romero J; Damico A; Zazzetti F; Barreira J; Marcos JC; Bellomio V.

Resultados

- ✓ **Período : febrero a agosto de 2012**
- ✓ **Pacientes: 549 de 23 centros de Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Bs As, CABA y Río Negro.**
- ✓ **NL: 243/549 (44%)**

	NL +	NL -	OR- IC	p
Edad Diagnostico	27±10.6	32±13 años		NS
Edad al ingreso al estudio	36±11	40±13 años		p=0.0002
Tiempo de evolución del LES	102±86	86±80 meses		p=0.020
N criterios ACR	7±1.6	5±1.4		NS
eritema malar	71%	62.4%	OR: 1.49, IC: 1.02-2.17	p=0.038
Neuro LES	13%	7 %	1.96, IC: 1.07-3.64	p=0.028
Serositis	38%	26.4%	1.72, IC: 1.18-2.52	0.0042
ac- DNAn +	64%	49%,	1.84, IC: 1.26-2.69	p=0.001
SLICC/ACR	1.30±2.53	0.69±1.32		p=0.0007



- ✓ **Conclusión: la prevalencia de Nefropatía Lúpica fue del 44% en 549 pacientes con LES .**
- ✓ **La histología predominante :IV en el 56.6%**
- ✓ **Los pacientes con NL se caracterizaron por ser más jóvenes y tener mayor evolución de la enfermedad.**
- ✓ **Presentaron con más frecuencia eritema malar, serositis, compromiso neurológico y presencia de acDNA.**
- ✓ **La asociación con mayor daño acumulado denota la severidad de la enfermedad en este subgrupo de pacientes.**

Próximo objetivo

- Actualmente 572 pacientes.
- Re enviar para correcciones
- Diciembre: vence fecha de envío resúmenes para LUPUS 2013
- Seguir incluyendo pacientes hasta los 1000?

B: Nuevos proyectos

- Nefropatía clase II (J Sarano, G Gomez y Victoria Collado de Lanari), trabajo multicéntrico en marcha al que eventualmente podríamos agregar casos.
- Registro multicéntrico de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico Sociedad Argentina de Reumatología (JC Barreira y equipo, Británico)/ Registro Nacional de pacientes con LES de la SAR.

Gracias por venir!!!!

albertospindler2003@yahoo.com.ar

mercedesgarcia16@gmail.com

